



FICHA TÉCNICA

# BELL PLUS

EFEECTO EN CADENA · CONTROLA NINFAS Y ADULTOS



COMPOSICIÓN	Indoxacarb 0,6% + Piriproxifen 0,5%
REGISTRO ISP	Pendiente
CLASE TOXICOLÓGICA	Clase III OMS, ligeramente peligroso
FORMATOS	Envase de 30 gr.

**BELL PLUS** es un efectivo e innovador cebo cucarachicida, elaborado con una matriz balanceada de insumos alimenticios rigurosamente equilibrados para entregar una óptima atracción y palatabilidad en ambientes de sobreoferta alimentaria. **BELL PLUS** ofrece un completo aporte de carbohidratos, proteínas y grasas, capaces de atraer los diferentes estadios ninfales y adultos de *Blattella germanica* (cucaracha alemana), *Blatta orientalis* (cucaracha oriental).

**BELL PLUS** está formulado con Indoxacarb y piriproxyfen, en dosis suficientes para permitir el transporte del cebo desde los lugares de consumo hasta los nidos, amplificando el efecto de **BELL PLUS** incluso en poblaciones que no tuvieron contacto directo con **BELL PLUS**.

El Indoxacarb es un ingrediente activo nuevo, perteneciente a la familia de las oxadiazinas. Indoxacarb es un precursor de metabolitos con efecto insecticida que, al entrar dentro del organismo de la cucaracha, sufre una serie de transformaciones químicas y enzimáticas que lo hacen activo, dirigiéndose al sistema nervioso donde afecta los flujos de los iones de sodio, causando la muerte.

**BELL PLUS** posee Piriproxyfen, un eficaz ingrediente activo que no solo afecta los procesos de la muda de las diferentes fases ninfales. **BELL PLUS** afecta la embriogénesis (se producen huevos sin embrión) al momento de la generación de estos, o bien reduce significativamente la fertilidad de las hembras.

Por el tipo y concentración de los ingredientes activos, **BELL PLUS** actúa en forma retardada, dentro de las 24 a 72 horas posteriores al consumo, lo que favorece el transporte del cebo a refugios y madrigueras que permiten el traspaso del cebo vía trofalaxia. **BELL PLUS** actúa indirectamente además al permanecer los ingredientes activos en las carcasas (exoesqueletos) o en los cadáveres de las cucarachas, favoreciéndola permanencia del efecto insecticida dentro de los refugios y madrigueras de las cucarachas.



**BELL PLUS** puede ser usado dentro de programas de manejo integrado de cucarachas en conjunto con Bordo 5ME, Cyperkill Max, Cyperkill Plus u otros productos de nuestra línea profesional.

## DOSIS .....

GRADO DE INFESTACIÓN	DOSIS	COMENTARIO
Alta infestación/ Tratamiento de choque	3 a 4 gotas por m <sup>2</sup>	Aplique en lugares de refugio de cucarachas como grietas, resumideros, bajo mesones, detrás de refrigeradores, en campanas de extracción.
Baja Infestación / Mantenimiento	1 a 2 gotas por m <sup>2</sup>	

Posee una DL50 superior a 5.000 mg/ kilo (Oral ratas)

## RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES .....

- Aunque el producto no emite vapores, ni se conoce de efectos adversos ni irritaciones sobre la piel, utilice guantes y mascarilla al momento de la preparación del producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de personas inexpertas, niños y animales.
- No permita el contacto con alimentos o agua de consumo.
- Evite ingerir el producto.
- Almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, fuera del alcance de personas inexpertas y animales
- No coma, fume o beba durante la aplicación.
- Una vez vacío el envase, dispóngalo en forma segura según las la regulación vigente.

## FORMULACIÓN .....

Cada 100 grs. de Bell Plus contienen:

Indoxacarb (CAS: 165252-70-0) .....	0,6% p/p
Piriproxifen (CAS 27519-02-4) .....	0,5% p/p
Beanzoato de Denantonium (CAS 3734-33-6) .....	0,1% p/p
Coformulantes c.s.p .....	100 grs.